

MVD-ACUUT-A3-FOLDER.NEO.INFECTIES (0707)

Neonatologie infecties



Infecties

Wanneer er een vermoeden is van een infectie bij uw baby, dit na de geboorte of zelfs als hij/zij enkele dagen oud is, is een opname op de neonatologie vereist.

Bij de opname worden stalen (bijv. van urine, bloed, ooggetter, lumbaal vocht,...) afgenomen, dit noemen wij culturen. Dit is noodzakelijk om te bepalen welke kiem uw baby ziek maakt. Het definitieve resultaat van deze culturen is pas gekend na 72 uur. Op te merken valt dat het mogelijk is dat er geen kiemen kunnen worden aangetoond, niettegenstaande uw baby wel ziek is.

Er wordt ook bloed afgenomen om de algemene toestand van uw baby op de voet te kunnen volgen.

Dit zal tijdens het verblijf van uw baby regelmatig herhaald worden, op voorschrift van de kinderarts.

Er kunnen ook nog radiologische (bijv. RX-foto van de longen, echografie,...) of andere onderzoeken nodig zijn.

Bij een infectie van een baby is het veelal nodig om direct intraveneus (=via een bloedvat) met antibiotica te starten. Dit gebeurt via een kathetertje die wij een abboath noemen. Dit kathetertje kan op verschillende plaatsen zitten: handjes, voetjes, elleboog of hoofdje. Het is altijd nodig om dit kathetertje goed te fixeren. Tijdens het verblijf van uw baby kan dit kathetertje van plaats veranderen.

De duur van de antibioticatherapie wordt bepaald door de kinderarts. Dit hangt onder andere af van de toestand van uw baby en van de resultaten van de culturen en bloedcontroles.

Bij de opname komt uw baby in een incubator te liggen en wordt aan een monitor gelegd. Dit om hem/haar beter te kunnen observeren. De duur hiervan zal ook afhangen van de toestand van uw baby.

Zieke baby's drinken meestal niet goed ook al zijn ze niet altijd prematuur geboren (= minder dan 37 weken zwangerschap). Om hem/haar voldoende vocht en voedingsstoffen te geven kan het dan nodig zijn dat uw baby een infuus krijgt en/of een maagsonde.

Bij borstvoeding begint u best af te kolven. Wij geven dan de afgekolfde moedermelk aan uw baby via een flesje of de maagsonde. Als de toestand van uw baby verbetert, spreken wij met u af om de baby aan de borst aan te leggen.

Meestal verdragen deze baby's in het begin van de infectie ook niet veel handelingen. Daarom wordt er soms beslist om de manipulaties en verzorging van uw baby te beperken. Het blijft natuurlijk belangrijk dat u praat tegen uw baby en eventueel uw handen op uw baby legt.

Uiteraard staan de artsen en verpleegkundigen altijd ter beschikking voor het beantwoorden van uw vragen.