

Labiaplastie

Vergrote binnenste schaamlippen (labia minora) kunnen zeer hinderlijk zijn, zowel vanuit een esthetisch opzicht als tijdens dagelijkse activiteiten. Ook tijdens het vrijen kunnen ze een oorzaak van ongemak zijn.

Dit huidoverschot van de kleine schaamlippen kan gecorrigeerd worden.

Wat houdt de ingreep in?

Een labiaplastie gebeurt tijdens een operatie die één tot anderhalf uur duurt. Er wordt gebruik gemaakt van de ALTER-methode, waarbij enkel een fijn litteken ontstaat aan de binnenzijde van de vagina en een lijntje langsheen de schaamlippen.

Er wordt géén amputatie uitgevoerd. Hoewel dit nochtans vaak wordt voorgesteld als oplossing, zorgt dit type ingreep voor een onregelmatig litteken op de rand van de schaamlippen, hetgeen vaak zeer pijnlijk is.

De ALTER-methode gebeurt onder volledige verdoving. Als u dit echt wil, kan de ingreep onder lokale verdoving uitgevoerd worden ook. U mag dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Een week na de ingreep komt u op postoperatieve controle. De hechtingen zijn verteerbaar en moeten dus niet verwijderd worden.

Vaak gestelde vragen

Zal het resultaat er natuurlijk uitzien?

Het voordeel van de ALTER-methode is dat de huid verwijderd wordt met enkel een litteken aan de binnenzijde. Op die manier blijft het zichtbare deel van de schaamlippen van littekens bespaard en kan een natuurlijk resultaat bekomen worden.

Er wordt vanzelfsprekend op gelet dat de symmetrie bewaard blijft. Eventuele asymmetrie (waarbij één schaamlip groter is dan de andere) kan ook gecorrigeerd worden.

Is er een risico op blijvende pijn na de operatie of verminderde gevoeligheid?

Omdat het litteken aan de binnenzijde ligt, is de kans op blijvende pijn verwaarloosbaar.

De gevoeligheid van de schaamlippen en clitoris blijft onveranderd. Sommige vrouwen vermelden zelfs een verbeterde gevoeligheid omdat het overschot aan huid verwijderd is en de clitoris op deze manier beter gestimuleerd wordt. Eventueel kan hiervoor ook een correctie van overtollige huid over de clitoris uitgevoerd worden (Clitoral Hood Reduction: zie “Geassocieerde ingrepen”).

Op welke leeftijd kan de ingreep uitgevoerd worden?

Dr. Vermeulen voerde de ALTER-methode uit op meisjes van 7 jaar, maar eveneens op vrouwen van 60 jaar. Er bestaat niet echt een reden om de ingreep niet uit te voeren omwille van leeftijd.

Kan ik op natuurlijke wijze bevallen na een correctie van de labia minora?

Dit is nog steeds mogelijk. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat, zoals bij elke vrouw, een episiotomie (knipje) moet gebeuren. Nochtans is dit geen reden om met een schaamlipverkleining te wachten, als u hinder ondervindt van de vergrote schaamlippen, of als u deze niet esthetisch vindt.

Geassocieerde Ingrepen

Clitoral Hood Reduction

Tijdens de operatie kan ook de huid over de clitoris bijgetrimd worden. Sommige vrouwen vragen daarentegen juist om de clitoris wat meer te bedekken, omdat deze te gevoelig is. Ook dit is mogelijk.

Verkleining van de grote, buitenste schaamlippen (Labia Maiora)

Meestal verdwijnt het vet uit de grote schaamlippen tijdens het ouder worden. Op dat moment kan het nodig zijn om dit vet opnieuw in te brengen (via lipostructuur), of het teveel aan huid te verwijderen. Ook dit gebeurt met aandacht voor symmetrie en plaatsing van de littekens. Deze littekens liggen tussen de grote en kleine schaamlippen en zijn dus onzichtbaar na de ingreep.

Vaginaplastie (Vaginale verjonging)

Na een bevalling kan de vagina, die dient als geboortekanaal, onder grote stress hebben gestaan. Deze uitrekking herstelt meestal uit zichzelf, maar soms blijft de vaginawand zeer slap. Op dat ogenblik is een vaginale verjonging noodzakelijk.

Een vaginaplastie kan tijdens dezelfde operatie van de schaamlipverkleining gebeuren.

G-spot vergroting

Ook al bestaat er controverse rond deze G-spot, verschillende vrouwen zijn gebaat bij een opspuiting van vet onder deze regio.

Door middel van lipostructuur wordt vet weggenomen op de dijen of buik en ingebracht onder de G-spot. Op die manier zal deze gemakkelijker gestimuleerd worden tijdens het vrijen.

Het gebruik van vet van het eigen lichaam heeft het grote voordeel dat de procedure niet moet herhaald worden. Het vet blijft jaren ter plaatse.

Contact

Bij bijkomende vragen of twijfels:

- dr. Pieter Vermeulen
*arts-specialist plastische en
reconstructieve heelkunde*
- dr. Stefaan Van den Berge
*arts-specialist plastische en
reconstructieve heelkunde*

T 050 36 51 42

RDPL-PLAST-FOLDER.LABIAPLASTIE (02/16)



algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge

T 050 36 91 11 > F 050 37 01 27 > info@stlucas.be > www.stlucas.be



www.facebook.com/AZ.Sint.Lucas.Brugge



[@StLucasBrugge](https://twitter.com/StLucasBrugge)



[AZ Sint Lucas Brugge](https://plus.google.com/AZ%20Sint%20Lucas%20Brugge)