

Zijn er risico's?

1. **Zenuwbeschadiging door de naald:**
Dit wordt tot een minimum herleid door gebruik van echotoestel.
2. **Allergische reactie:**
Het is belangrijk allergieën aan lokale verdovingsmiddelen te melden.
3. **Bloeduitstorting:**
Het is belangrijk om het gebruik van bloedverdunners te melden.
4. **Kortademigheid:**
Kan voorkomen wanneer de zenuw die uw middenrif bezenuwd eveneens verdoofd is.
5. **Medicatie in het bloedvat**

Contact

Vragen hierover?

Neem contact op met de pijnverpleegkundige.

T 050 36 59 34

Maandag tot en met vrijdag 9.00u – 11.00u

Niet beschikbaar op feestdagen.

Buiten deze uren kan je terecht bij **EVA – Vpk.**

T 050 36 53 33

Maandag tot en met vrijdag 14.00u - 18.00u

Niet beschikbaar op feestdagen.

MVD-KRIT-ANESTH-FOLDER-PLEXUSANESTHESIE (10/23)



Plexusanesthesie

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
Ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge

Een operatie aan de hand, pols, elleboog en schouder kan onder plaatselijke verdoving.

Wat betekent ‘zenuwblock’?

De zenuwbundel die naar de arm loopt, ook wel de plexus brachialis genoemd, wordt verdoofd. Hierdoor gaat er een gedeelte van uw arm tijdelijk gevoelloos zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het zenuwblock wordt uitgevoerd net voor de operatie in de voorbereidingsruimte van de operatiezaal. Omdat een plexusverdoving tijd nodig heeft om in te werken, zal u enige tijd voor de operatie de verdoving toegediend krijgen. De anesthesist kiest een plaats voor je verdoving. Deze is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type en de plaats van je operatie, je lichaamsbouw, enzovoort. Dit kan in je hals zijn, boven of onder je sleutelbeen of in je oksel. Deze plaats wordt ontsmet, vervolgens worden de zenuwen zichtbaar gemaakt d.m.v. ‘echografie’ (een pijnloze radiologische techniek waarbij koude gel op de zone van de injectieplaats wordt aangebracht). Eens de zenuwen duidelijk zichtbaar zijn, worden ze gestimuleerd d.m.v. een ‘zenuwstimulator’. Dan worden ze verdoofd met lokale verdoving langs de naald.

Moet ik nog slapen als mijn hand reeds slaapt?

Na het verdoven van de zenuwbundel hoeft u niet volledig onder narcose. Er kan wel geopteerd worden voor een lichte sedatie (=roesje).

Kan iedereen een handblock krijgen?

Het overgrote deel van de patiënten komt in aanmerking, maar er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de anesthesist verkiest om dit niet uit te voeren.

