

Uw afspraak

- Datum:
- Na inschrijving via één van de kiosken in de centrale hal, meldt u zich aan in het **dagziekenhuis inwendige geneeskunde** omuur (verdieping 1, route B 132).
- Uur onderzoek:
- Opname-arts (radioloog):

Beelden opvragen

Het opvragen van de beelden van uw onderzoek kan via de rubriek 'Mijn radiologiebeelden' van onze website www.stlucas.be.

Vul onderstaande gegevens in:

- referentienummer;
- geboortedatum (DDMMYYYY aan elkaar, zonder tekens).

Hiermee kan u enkel de beelden opvragen, voor het verslag wendt u zich tot uw behandelende arts. Let wel, de beelden zijn pas online beschikbaar na validatie van het onderzoek door de radioloog. Voor een MR-onderzoek kan dit tot 48u duren.

Alle beelden ouder dan één jaar werden gedeactiveerd. Om deze opnieuw online beschikbaar te maken, kan u contact opnemen met de dienst radiologie op T 050 36 53 85.

Dienst radiologie

Digitale radiologie
Echografie - doppler
CT-scan
MR-scan
Mammografie
Interventionele onderzoeken
Biopsie en drainages

Artsen

dr. Piet Dekimpe
dr. Thierry De Schrijver
dr. Alexander Favril
dr. Koen Geldof
dr. Hilde Goris
dr. Kristof Ramboer
dr. Pieter Vandaele - medisch diensthoofd
dr. Andries Van Holsbeeck
dr. Laurence Verhaeghe

Secretariaat

T 050 36 53 85
F 050 36 53 87
e-mail: secrx@stlucas.be



Inleiding

Uw behandelende arts heeft een arteriografie voorgeschreven. Dit is een radiologisch onderzoek van de slagaders. Door middel van het inbrengen van een katheter in een slagader en het inspuiten van contrastvloeistof, worden vernauwingen, verstoppingen, uitzettingen of andere abnormaliteiten van de slagaders opgespoord.

Zeer belangrijk

Voor het maken van een afspraak of indien u de afspraak niet kan nakomen, kan u steeds terecht op het secretariaat van de dienst radiologie op het nummer 050 36 53 85.

Vermeld hier steeds indien:

- ☞ u allergisch bent aan contrastmiddel, aardbeien, schaaldieren, tomaten, enz.;
- ☞ u lijdt aan hooikoorts of astma;
- ☞ u allergisch bent aan verdovings- en ontsmettingsmiddelen, kleefpleisters, enz.;
- ☞ u (mogelijks) zwanger bent;
- ☞ u bloedverdunnende medicatie inneemt.

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 4 uur voor het onderzoek niet mag eten of drinken.

Als u een afwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, dan kan u dit vragen aan het secretariaat van de dienst radiologie.

Voor het onderzoek

In het dagziekenhuis inwendige geneeskunde (route B 132) gebeurt de nodige voorbereiding (zoals het plaatsen van een infuus in de arm, bloedafname, het scheren van de liesstreek, enz.).

U wordt vervolgens in bed naar de dienst radiologie gebracht.

Het onderzoek zelf

Voor u mag plaatsnemen op tafel wordt er gevraagd nog eens naar het toilet te gaan. De verpleegkundige ontsmet de plaats waar de radioloog straks zal verdoven en prikken. Na de verdoving wordt er een groot blauw doek over u gelegd zodat de radioloog steriel kan werken. Vervolgens prikt de radioloog de slagader aan met een katheter. Van die prik voelt u niets, u kan enkel wat druk gewaarworden. Vervolgens wordt de katheter opgeschoven naar de plaats die de radioloog wil onderzoeken (vb. tot in de hersenen voor opnames van de intracraniële vaten, tot in de buik voor opnames van de buikslagaders, enz.). Via die katheter wordt er contrastvloeistof ingespoten waardoor de slagaders zichtbaar worden. Tijdens het inspuiten kan u gevraagd worden om in te ademen, de adem op te houden en niet te bewegen. Ook kan u een kortstondig warmtegevoel in de hals en onderbuik waarnemen tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof.

De totale duur van dit onderzoek is gemiddeld 45 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt de katheter verwijderd (als geen thrombus aanwezig is) en wordt de punctieplaats 10 tot 15 minuten afgedrukt door de verpleegkundige om nabloeden te voorkomen. Daarna wordt er een drukverband aangelegd. Indien u geen andere onderzoeken meer nodig heeft, wordt u terug naar het dagziekenhuis inwendige geneeskunde gebracht. De punctieplaats moet door de verpleegkundige in het dagziekenhuis regelmatig gecontroleerd worden op nabloeden. In het dagziekenhuis moet u minstens nog een 4-tal uur in bed blijven, dit om nabloeden van de insteekplaats te vermijden. Ook is het raadzaam om na het onderzoek veel (+/- 1 liter) water te drinken. Er bestaat altijd een kleine kans dat er een laattijdige reactie optreedt (tot 12 uur na het onderzoek, bv. jeuk, niezen, uitslag, moeilijkere ademhaling) na het toedienen van contrastvloeistof. Aarzel dan niet om contact op te nemen met de verpleegkundige van de dienst radiologie of de verpleegkundige van het dagziekenhuis.