

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met paclitaxel albumine (Abraxane®) - gemcitabine (Gemzar®)

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Abraxane® (paclitaxel albumine) en Gemzar® (gemcitabine).

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt vier weken (28 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Je krijgt je therapie drie weken opeenvolgend toegediend met daarna een rustweek. Dit wil zeggen dat je een toediening krijgt op dag 1, dag 8 en dag 15 van elke cyclus.

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-14	15	16-28	
Paclitaxel albumine	Abraxane®	•		•		•	Rust	Infuus over 30 minuten
Gemcitabine	Gemzar®	•		•		•	Rust	Infuus over 30 minuten

Waar wordt de therapie toegediend?

Deze behandeling wordt in het dagziekenhuis gegeven.

Aandachtspunten bij Abraxane® - Gemzar®

- Tijdens de behandeling met Abraxane® eet of drink je geen pompelmoes(sap), sterfruit of bloedsinaasappels en gebruik je geen preparaten op basis van sint-janskruid (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van A. Vogel).
- Je kunt wat vocht opstapelen. Je gewicht kan daardoor toenemen.
- De oplossing met Abraxane® ziet er troebel uit. Dat is normaal.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Zorg voor een goede nagelverzorging
- Voorzie een alternatief (pruik, sjaaltje ...)

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bijvoorbeeld aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverlies
- Huidveranderingen, tijdelijke huiduitslag
- Nagelveranderingen
- Grieperig gevoel: hoofdpijn en/of duizeligheid
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen