

GYNAECOLOGIE - VERLOSKUNDE

Inleiding van de bevalling met een ballonkatheter



Na overleg met je gynaecoloog is beslist om de bevalling in te leiden. Voor we daarmee kunnen starten, moet je baarmoederhals voldoende rijp zijn. Dat betekent dat de baarmoederhals week moet worden, voldoende dun moet zijn en enkele centimeters ontsloten (de zogenaamde 'opening'). Deze rijping gebeurt met behulp van een ballonkatheter die de avond vóór de inleiding wordt geplaatst.



Hoe werkt een ballonkatheter?

De gynaecoloog brengt tijdens een gynaecologisch onderzoek een katheter in de baarmoederhals. In deze katheter zitten twee ballonnen. Deze worden gevuld met water waardoor de baarmoederhals tussen de twee ballonnen geklemd komt te zitten. Door de druk van de ballonnen komen er stoffen vrij die het rijpingsproces versnellen.



De katheter zit hoog in de vagina waardoor je geen hinder ondervindt als je rondwandelt, een douche neemt of in bad gaat. Het uitrij-

pen van de baarmoederhals kan soms wat menstruatiepijn of harde buiken veroorzaken. Het is heel normaal om oefenweeën of zelfs echte weeën te ervaren. Dit komt door het werkingsmechanisme van de ballonkatheter. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Meestal starten deze oefenweeën ongeveer twee uur na de plaatsing. Je kan gerust een warm bad of douche nemen of paracetamol als pijnstiller.

Het grote voordeel van de ballonkatheter is dat het enkel een mechanisch effect heeft op de baarmoederhals en niet op de rest van de baarmoeder. Bovendien wordt er geen medicatie gebruikt, waardoor de baby hier ook geen invloed van ondervindt.

De katheter blijft ongeveer 12 uur zitten en wordt pas de volgende ochtend verwijderd. Daarna beoordeelt de gynaecoloog wat de volgende stap is om de bevalling verder in te leiden.

Hoe verloopt de verdere inleiding?

De verdere inleiding kan op verschillende manieren gebeuren. Je gynaecoloog bespreekt dit altijd samen met jou.

Pilletjes om de baarmoederhals nog verder te laten rijpen

Als de baarmoederhals na het wegnemen van de ballonkatheter toch nog niet rijp genoeg is, wordt dit proces soms nog verder gestimuleerd door pilletjes die je via de mond inneemt.

Het breken van de vliezen

Als de baarmoederhals goed rijp is maar de weeën nog niet voldoende op gang zijn gekomen, kunnen de vliezen kunstmatig gebroken worden. Dit wordt met een fijn plastic haakje gedaan tijdens een vaginaal onderzoek. Dit is niet pijnlijk.

Een infuus met een middel om de weeën te stimuleren

Als de weeën niet voldoende op gang komen, geven we via een infuus een extra stimulatie met het hormoon oxytocine.

Praktische informatie

- De gynaecoloog zal je laten weten hoe laat je in het Verloskwartier verwacht wordt.
- Begeef je naar het verloskwartier (↗ Route B 337 - 3e verdieping) en bel aan.
- Bij aankomst word je eerst aan de monitor aangesloten om het hartritme van de baby te registreren. Daarna wordt de ballonkatheter geplaatst en wordt de monitor nog eens aangesloten.
- Als je zwangerschap verder zonder complicaties is verlopen, kun je na het plaatsen van de ballonkatheter naar huis en kom je de volgende ochtend terug. Je gynaecoloog bespreekt met jou of dit mogelijk is. Als dat niet het geval is, blijf je in het ziekenhuis overnachten.

Meer informatie of een afspraak maken?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Raadpleging Gynaecologie-Verloskunde

🕒 Elke werkdag van 9.00 tot 18.00 uur

☎ 050 36 50 80

📍 Route D 076 - gelijkvloers

Verloskwartier

🕒 's Avonds of in het weekend

☎ 050 36 90 90

📍 Route B 337 - 3e verdieping



AZ Sint-Lucas Brugge

📍 Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge

☎ 050 36 91 11 ✉ info@stlucas.be 🌐 www.stlucas.be