

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met Modified FOLFIRI

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): irinotecan en fluorouracil (5FU). Deze chemotherapie heeft een invloed op de celdeling, waardoor de groei van kankercellen wordt geremd. Daarnaast bevat de therapie ook levofolinezuur. Dit is geen cytostaticum, maar zorgt voor een betere werking van 5FU.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.

Eén cyclus duurt **2 weken** (14 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag 1	2	3	4	5-14	Wijze van toediening
Irinotecan	Campto®	•					Infuus over 90 minuten
Levofolinezuur	Elvorine®	•					Infuus over 2 uur
5FU	Fluoro-Uracil®	•					Infuus over 10 minuten
5FU	Fluoro-Uracil®	• →	→	//			Infuus over 46 uur met Infusor®
Ondersteunende medicatie							
Medrol® 32 mg		•	•	•	•		Tablet, inname via de mond

Ondersteunende medicatie

Door de therapie kan je een gevoel van misselijkheid en/of braken ervaren. Medrol® helpt om deze klachten te verminderen. Het is aan te raden Medrol® 32 mg 's ochtends in te nemen, tot 3 dagen na de toediening van de chemotherapie.

Waar wordt de therapie toegediend?

De toediening van Modified FOLFIRI gebeurt in het oncologisch dagziekenhuis. Een overnachting is niet nodig.

Op dag 1 van elke cyclus krijg je irinotecan toegediend via een infuus. Nadien krijg je 5FU toegediend via een infuuspompje (Infusor®). Met dit infuuspompje ga je naar huis: het loopt verder over 46 uur (dus iets minder lang dan 2 dagen). Op dag 3 zal de thuisverpleegkundige het infuuspompje komen afschakelen.

Aandachtspunten bij Modified FOLFIRI

- Voor elke toediening van irinotecan krijg je een inspuiting met atropine. Dit medicijn dient om een mogelijke bijwerking te voorkomen die soms kort na de toediening kan optreden. Deze reactie wordt een acuut cholinerg syndroom genoemd en kan zich uiten in symptomen zoals zweten, overmatige speekselproductie, een loopneus, buikpijn of diarree. Meld direct aan je verpleegkundige als je een van die symptomen ervaart.
- Je krijgt chemotherapie via het infuuspompje toegediend zonder extra vocht. Daarom is het belangrijk dat je voldoende drinkt (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en na de toediening ervan.
- Tijdens je behandeling met Modified FOLFIRI wordt je huid extra gevoelig voor zonlicht. Daardoor kan je sneller verbranden. Bescherm je daartegen en vermijd zoveel mogelijk direct én indirect zonlicht.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverlies
- Huidveranderingen
- Nagelveranderingen
- Ooglast