

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met mitomycine-C - 5FU - radiotherapie

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit radiotherapie (bestraling) en twee celremmende geneesmiddelen: mitomycine-C en fluorouracil (5FU). Deze chemotherapie beïnvloedt de celdeling, remt de groei van kankercellen en versterkt het effect van de bestraling.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt één week (7 dagen) en omvat één dagopname voor chemotherapie.

- Op dag 1 van de cyclus krijg je één keer mitomycine-C toegediend.
- Op dag 1 start ook de toediening van 5FU. Deze chemotherapie krijg je gedurende zeven dagen toegediend via een infuuspompje.
- De bestraling gebeurt vijf dagen per week, één tot twee keer per dag.
- De volgende cyclus start in principe één week na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag			Wijze van toediening
		1	2-5	6-7	
Mitomycine-C		•			Infuus over 10 minuten
Fluorouracil (5FU)	Fluoro-Uracil®	•	•	•	Infusor® over 168 uur (7 dagen)
Radiotherapie		•	•		Uitwendige bestraling

Waar wordt de therapie toegediend?

Je behandeling vindt plaats in het dagziekenhuis Oncologie. Een overnachting is doorgaans niet nodig.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Zorg voor een goede hand- en voetverzorging
- Voorzie een alternatief (pruik, sjaaltje ...)

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverlies
- Huidveranderingen
- Handvoetsyndroom
- Nagelveranderingen
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen