

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met Modified De Gramont

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): 5FU. Daarnaast bevat de therapie ook levofolinezuur. Dit is zelf geen cytostaticum, maar zorgt ervoor dat 5FU beter werkt.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.

Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag 1	2	3	4-14	Wijze van toediening
Levofolinezuur	Elvorine®	•				Infuus over 2 uur
5FU	Fluracedyl®	•				Infuus over 10 minuten
5FU	Fluracedyl®	• →	→	//		Infuus over 46 uur met Infusor®

Waar wordt de therapie toegediend?

Je krijgt de chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend in het dagziekenhuis Oncologie. Een overnachting is niet nodig.

Op dag 1 krijg je eerst therapie via infusen. Daarna krijg je een Infusor®-pompje waarmee je naar huis kunt. Dit pompje werkt gedurende 46 uur (net geen 2 dagen dus). Op dag 3 wordt de Infusor® afgeschakeld door de thuisverpleegkundige.

Aandachtspunten bij Modified De Gramont

Je krijgt het pompje chemotherapie zonder extra vocht toegediend. Daarom is het belangrijk dat je voldoende (1,5 tot 2 liter) drinkt tijdens de toediening ervan thuis.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Hand- en voetverzorging

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverdunning, zeer zelden haarverlies
- Tijdelijke huiduitslag
- Handvoetsyndroom, zelden
- Ooglast