

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met trastuzumab - deruxtecan (Enhertu®)

Wat is de samenstelling van deze therapie?

Enhertu® (ook bekend als T-DXd) combineert twee geneesmiddelen in één therapie: trastuzumab en deruxtecan. Trastuzumab is een doelgerichte therapie die zich specifiek bindt aan de HER2-receptor op kankercellen. Dit helpt de groei van kankercellen te remmen.

Zodra trastuzumab zich aan de HER2-receptor hecht, wordt het tweede geneesmiddel vrijgegeven. Dat is deruxtecan. Deruxtecan vernietigt de kankercel. De combinatie zorgt dat deruxtecan vooral in de kankercellen terechtkomt, waardoor het gezonde weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt drie weken (21 dagen) en omvat één dagopname voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de bloeuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag 1	Dag 2-21	Wijze van toediening
Trastuzumab - deruxtecan	Enhertu®	•		Eerste toediening: infuus over 90 minuten. Als er geen infuusreactie is, is de inlooptijd vanaf de tweede toediening 30 minuten.

Waar wordt de therapie toegediend?

De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis. Een overnachting is niet nodig.

Aandachtspunten bij trastuzumab - deruxtecan

- Tijdens de eerste toediening van trastuzumab - deruxtecan gebeurt het af en toe dat er een infuusreactie of een **allergische reactie** optreedt. Een allergische reactie kenmerkt zich door huiduitslag (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
- Trastuzumab - deruxtecan kan een invloed hebben op je **hartfunctie**. Je zal daarom op regelmatige tijdstippen een hartfunctieonderzoek krijgen. Meld het aan je arts als je last krijgt van kortademigheid, pijn in de borstkas of opgezwollen voeten.
- Trastuzumab - deruxtecan kan **een ontsteking ter hoogte van de longblaasjes** veroorzaken. Deze bijwerking is zeldzaam maar kan wel ernstig zijn. Symptomen kunnen zijn: hoest, kortademigheid, koorts en/of nieuwe of ergere ademhalingssymptomen. Neem direct contact op met je behandelende arts als je deze symptomen hebt, ook als deze mild zijn.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bijvoorbeeld aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverdunning, zelden volledig haarverlies
- Ooglast
- Grieperig gevoel: hoofdpijn en/of duizeligheid