

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met tremelimumab - durvalumab

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit twee geneesmiddelen, namelijk tremelimumab en durvalumab. Tremelimumab en durvalumab helpen je immuunsysteem om kankercellen beter te herkennen en aan te vallen. Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt vier weken (28 dagen) en omvat één dagopname voor therapie.

- Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- Tijdens de eerste cyclus krijg je beide geneesmiddelen toegediend. Vanaf cyclus 2 wordt enkel durvalumab toegediend.

Generieke naam	Merknaam	Dag 1	Dag 2-28	Wijze van toediening
Tremelimumab	Imjudo®	•		Infuus over 1 uur, enkel tijdens cyclus 1
Durvalumab	Imfinzi®	•		Infuus over 1 uur

Waar wordt de therapie toegediend?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Een overnachting is niet nodig.

Aandachtspunten bij tremelimumab - durvalumab

- Mogelijk doet zich een **infuusreactie** voor, tijdens of na de toediening van tremelimumab en/of durvalumab. Als een reactie voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Meld dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk aan de verpleegkundige of arts, zodat we vlug en adequaat kunnen reageren.
- Het is erg belangrijk dat een auto-immuunreactie tijdig wordt vastgesteld en behandeld. Welke klachten kunnen wijzen op een auto-immuunreactie, vind je in de gids. Neem direct contact op met je behandelende arts als je klachten ervaart die hierop kunnen wijzen.

Mogelijke nevenwerkingen

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen, huiduitslag
- Ongewone vermoeidheid
- Misselijkheid
- Invloed op seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet