

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met encorafenib (DIO)

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel, namelijk encorafenib. Deze doelgerichte therapie heeft invloed op bepaalde eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kanker.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Encorafenib wordt gecombineerd met een andere celremmende therapie, namelijk cetuximab. Informatie over cetuximab vind je in een aparte bijlage.

Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek, een voorraad capsules en de toediening van cetuximab. Je neemt de capsules encorafenib thuis in.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen). Encorafenib wordt dagelijks ingenomen.

Encorafenib bestaat in capsules van 50 mg en 75 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Medicatie	Dosis	Week 1	Week 2	Week 3
Encorafenib	1x per dag mg	✓	✓	✓

Inname

- Encorafenib neem je één keer per dag in, bij voorkeur 's morgens.
- Encorafenib neem je best systematisch op een lege maag of bij de maaltijd in.
- Interactie met voeding: vermijd pompelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid op het moment dat je encorafenib inneemt.
- Als je een dosis encorafenib bent vergeten, kun je de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis. Is er minder dan 12 uur tot je volgende dosis? Sla de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Aandachtspunten bij encorafenib

- Door de inname van encorafenib kun je last hebben van koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Daarvoor mag je 1 gram paracetamol innemen, maximaal vier keer per dag. Controleer je lichaamstemperatuur vóór de inname van paracetamol.
- Soms krijg je last van wazig zicht, droge of rode ogen of een ontsteking van de ogen. Neem in dat geval contact op met je arts.
- De medicijnen kunnen een invloed hebben op de werking van je hart. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn in de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.

- Door de inname van encorafenib is je huid heel gevoelig voor zonlicht, kan je snel verbranden en kan de huiduitslag door het zonlicht verergeren. Bescherm je tegen zonlicht en vermijd zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Zorg voor een goede hand- en voetverzorging

Mogelijke nevenwerkingen

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - > Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - > Huiduitslag in de vorm van puistjes
 - > Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Haarveranderingen, meestal haarverlies
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn