

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met bevacizumab (Mvasi®)

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel: bevacizumab. Dit is een doelgerichte therapie.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe werkt de medicatie?

Bevacizumab heeft een invloed op de bloedvatvorming van de tumor. Daardoor wordt de tumor niet meer voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. Op die manier remt bevacizumab de groei van de tumor af.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.

Bevacizumab wordt toegediend in monotherapie of in combinatie met chemotherapie en/of immunotherapie. Bevacizumab wordt om de 2 weken (14 dagen) toegediend. Dat is afhankelijk van de therapie waarmee bevacizumab gecombineerd wordt. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag 1	2 - 14	Wijze van toediening
Bevacizumab	Avastin®	•		De eerste 2 toedieningen worden trager gegeven. Vanaf cyclus 3 dienen we bevacizumab, als je het goed verdraagt, over 30 minuten toe.

Waar wordt de therapie toegediend?

Je krijgt de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend. De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis Oncologie.

Aandachtspunten bij bevacizumab

- Een **allergische reactie** doet zich zelden voor. Als dit toch gebeurt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een reactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan een verpleegkundige of arts, zodat we vlug en adequaat kunnen reageren.
- Door bevacizumab kan het **eiwitgehalte** in de urine verhoogd zijn. Daarom wordt het eiwit in de urine voor elke toediening gecontroleerd.
- Door de toediening van bevacizumab kan je last hebben van een **verhoogde bloeddruk**. Daarom raden we aan om thuis elke dag je bloeddruk te controleren. Noteer de waarden van je bloeddruk in een dagboek. Contacteer je huisarts of behandelende arts als:
 - > je bloeddruk bij herhaalde metingen verspreid over de dag of gedurende meerdere opeenvolgende dagen hoger is dan 140/90 mmHg.
 - > je last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of sterretjes voor de ogen ziet.

De toediening van bevacizumab kan pas plaatsvinden wanneer je bloeddruk voldoende gezakt is.

- Een normale **wondgenezing** kan door bevacizumab verstoord worden. Het is belangrijk dat je eventuele heelkundige ingrepen bespreekt met je behandelende arts. Sommige ingrepen worden beter uitgesteld of we stellen de toediening van bevacizumab uit. Het is ook belangrijk dat je wondjes die je hebt opgelopen toont aan je behandelende arts of verpleegkundige, zodat we een gepaste behandeling kunnen voorzien. Ook bij plotse en abnormale gewaarwordingen zoals pijn en zwelling is het belangrijk dat je contact opneemt met je (huis)arts.
- Door de toediening van bevacizumab kan je last krijgen van **bloedingen** aan de slijmvliezen of van neusbloedingen.

Als je thuis een neusbloeding krijgt, blijf dan rechtop zitten en snuit flink de neus, zodat het meeste bloed eruit is. Knijp daarna je neus vlak onder het neusbeen gedurende 10 minuten dicht. Buig je hoofd licht voorover en blijf rustig doorademen door je mond. Als het bloeden gestopt is, probeer dan je neus niet te snuiten. Door het snuiten komt mogelijk het bloedstolsel los, waardoor je neus opnieuw begint te bloeden.

Stopt het bloeden niet, neem dan contact op met je (huis)arts. Begin alleszins niet zelf met andere maatregelen zoals bloedstelpende watten.

- Als bevacizumab wordt gecombineerd met chemotherapie of immunotherapie, kunnen zich nog **andere nevenwerkingen** voordoen.