

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met paclitaxel (Taxol®) - carboplatine (Paraplatin®) wekelijks (MBC, GNC, DIO)

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): paclitaxel en carboplatine. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 1 week (7 dagen) en omvat 1 opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 1 week na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag -1	1	2-6	7 (dag -1)	Wijze van toediening
Paclitaxel	Taxol®		•			Infuus gedurende 1 uur
Carboplatine	Paraplatin®		•			Infuus gedurende 1 uur
Ondersteunende medicatie						
Dexamethason		20 uur	8 uur		20 uur	Capsule dexamethason 10 mg
Zyrtec® (cetirizine)		20 uur	8 uur		20 uur	Tablet Zyrtec® 10 mg

Je neemt de ondersteunende medicatie als volgt:

- De avond vóór elke chemotherapietoediening (dag -1)
- De ochtend van elke chemotherapietoediening (dag 1)

Belang van ondersteunende medicatie

Het is belangrijk dat je de ondersteunende medicatie (namelijk dexamethason en Zyrtec®) inneemt omdat deze medicatie de nevenwerkingen van paclitaxel en carboplatine vermindert.

De chemotherapie kunnen en mogen we enkel toedienen als je deze medicatie zoals voorgeschreven hebt ingenomen vóór de toediening. Meld het aan je arts of verpleegkundige als je de medicatie bent vergeten.

Waar wordt de therapie toegediend?

De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis Oncologie. Een overnachting is niet nodig.

Aandachtspunten bij paclitaxel-carboplatine

- De inname van **corticosteroïden** (namelijk dexamethason) kan bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen en verhoogde eetlust. Toch is het belangrijk dat je deze medicatie inneemt zoals voorgeschreven. De medicatie is belangrijk voor je behandeling. Bespreek je klachten met je zorgverleners.
- Het komt af en toe voor dat iemand **allergisch reageert** op paclitaxel of carboplatine. Een allergische reactie kenmerkt zich door het optreden van huiduitslag (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Meld dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk aan de verpleegkundige of arts zodat we vlug en adequaat kunnen reageren.

Nevenwerkingen voorkomen

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Zorg voor een goede nagelverzorging
- Voorzie een alternatief (pruik, sjaaltje ...)

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bijvoorbeeld aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverlies
- Nagelveranderingen
- Grieperig gevoel
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen